

ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ ТУБЕРКУЛЕЗА



для защиты от туберкулеза в России используются вакцины БЦЖ и БЦЖ-М



БЦЖ

- “классическая”
- одна доза содержит 0,05 мг микробных клеток
- для вакцинации и ревакцинации



БЦЖ-М

- более “легкая”
- одна доза содержит 0,025 мг микробных клеток
- для вакцинации

Показания к применению: профилактика туберкулеза у детей



для территорий с показателями заболеваемости туберкулезом выше 80 на 100 тысяч населения



при наличии в окружении новорожденного больных туберкулезом



для территорий с показателями заболеваемости туберкулезом менее 80 на 100 тысяч населения




Схема вакцинации:

V – новорожденным на 3-7 день жизни

RV – в 6-7 лет (при отрицательном результате пробы Манту)

ЕСТЬ ВАКЦИНА! ТУБЕРКУЛЕЗ

Туберкулез - заразное заболевание, им инфицировано около

2×10^9

людей

Осложнения: легочное кровотечение, плеврит, пневмония, милиарный туберкулез (распространение на другие органы и системы), сердечная недостаточность



Риск того, что инфицированные люди заболеют туберкулезом, составляет

10%

Симптомы: поражение легких, внутригрудных лимфоузлов, внелегочные симптомы (поражение костей, суставов, почек, брюшной полости, менингит)



Один больной активной формой туберкулеза способен заразить до

15

человек за год

Вакцинация самая эффективная мера профилактики туберкулеза



СКРИНИНГ НА ТУБЕРКУЛЕЗ




организация и проведение профилактических медицинских осмотров для раннего выявления туберкулеза и факторов риска его развития

Детям до 17 лет 1 раз в год

- внутрикожные тесты с туберкулезными аллергенами (реакция Манту и Диаскинтест)
- флюорографическое обследование (дети с 15 лет)

Взрослым не реже 1 раза в 2 года:


флюорографическое обследование



Своевременное выявление туберкулеза позволяет начать лечение как можно раньше, сократить его сроки, добиться полного выздоровления и реабилитации больного



ПРОБА МАНТУ



ДИАСКИНТЕСТ



КВАНТИФЕРОНОВЫЙ ТЕСТ



КАК ПРОВОДИТСЯ

ВНУТРИКОЖНО

ВНУТРИКОЖНО

ИССЛЕДОВАНИЕ КРОВИ

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

ЕСТЬ

ЕСТЬ

НЕТ

СПЕЦИФИЧНОСТЬ

НИЗКАЯ

ВЫСОКАЯ

ВЫСОКАЯ

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ
РЕАКЦИИ У БЦЖ-
ВАКЦИНИРОВАННЫХ

ДА

НЕТ

НЕТ

МОЖНО ЛИ ПРОВОДИТЬ
ПОСЛЕ ВАКЦИНАЦИИ

**НЕ РАНЕЕ ЧЕМ
ЧЕРЕЗ МЕСЯЦ**

**НЕ РАНЕЕ ЧЕМ
ЧЕРЕЗ МЕСЯЦ**

**МОЖНО ПРОВОДИТЬ
В ДЕНЬ ВАКЦИНАЦИИ**

**В СЛУЧАЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО РЕЗУЛЬТАТА ЛЮБОГО ТЕСТА
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА-ФТИЗИАТРА**

